

Documentación suplementaria

Tabla Suplementaria 1: Cambio porcentual anual promedio (CPAP) nacidos vivos ocurridos e inscritos (NVOI), nacidos vivos corregidos (NVC), muertes maternas (MM), tasa de natalidad (TN) en Chile, períodos 1990-2001 y 2002-2015.

	Período 1990-2001			Período 2002-2015		
	CPAP	IC 95%	p	CPAP	IC 95%	p
NVOI	-1,6	-1,7 a -1,5	<0,05*	0,1	-0,3 a 0,6	0,54
NVC	-1,6	-1,7 a -1,5	<0,05*	-0,2	-0,7 a 0,3	0,39
MM	-8,2	-9,6 a -6,8	<0,05*	-0,4	-2,3 a 1,5	0,86
TN	-3,0	-3,2 a -2,9	<0,05*	-1,2	-1,6 a -0,7	<0,05*

*CPAP significativamente diferente de 0 con alfa de 0,05.

Tabla Suplementaria 2: Razones de mortalidad materna^a según edad, para las primeras cinco causas de muerte materna. Chile 1990-2001.

Edad (años)	Hipertensión arterial (O10-O16)	Aborto (O02-O07)	Enfermedades concurrentes (O99)	Sepsis puerperal (O85)	Hemorragia posparto (O72)
10-14	8,5	8,5	---	8,5	---
15-19	5,4	4,7	3,0	1,7	0,6
20-24	4,8	3,4	4,0	1,8	1,2
25-29	4,8	5,5	4,1	1,1	0,8
30-34	7,1	6,8	3,0	2,2	0,9
35-39	10,9	10,9	4,0	2,2	3,4
40-44	10,6	9,3	15,9	4,0	10,6
45-54	23,7	---	---	---	---

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.

^a Por 100 000 nacidos vivos ocurridos e inscritos.

Tabla Suplementaria 3: Razones de mortalidad materna^a según edad, para las primeras cinco causas de muerte materna. Chile 2002-2015

Edad (años)	Enfermedades concurrentes (O99)	Hipertensión arterial (O10-O16)	Aborto (O02-O07)	Embarazo ectópico (O00)	Hemorragia posparto (O72)	Embolia Obstétrica (O88)
10-14	8,6	8,6	---	---	---	---
15-19	1,6	2,8	1,4	---	0,2	0,8
20-24	5,1	2,4	0,7	0,3	0,3	0,4
25-29	4,2	4,2	1,3	0,6	0,6	0,4
30-34	4,9	4,4	1,0	1,5	0,8	1,0
35-39	8,8	7,1	1,6	2,5	1,1	1,2
40-44	17,9	10,0	1,0	---	5,0	0,8
45-54	100,1	---	40,0	---	---	---

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.

^a Por 100 000 nacidos vivos ocurridos e inscritos.